



FORTALEZA® 40 WP

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Ingrediente activo: Myclobutanil 400 g/kg

Registro ICA. 1242

Formulación: Polvo Mojable (WP)

Uso: Fungicida de uso agrícola

FRAC: G1

MODO DE ACCIÓN

FORTALEZA® 40WP: Fungicida sistémico perteneciente al grupo químico de los Triazoles, preventivo y curativo, recomendado para el control de enfermedades foliares y de los frutos. Perteneciente a la familia de los Ibe's, por lo que su modo de acción está dado por la inhibición de la biosíntesis del ergosterol

COMPATIBILIDAD

No es compatible con productos de reacción alcalina. No tiene acción corrosiva sobre los equipos de aplicación

CATEGORIA TÓXICOLOGICA: III- LIGERAMENTE PELIGROSO

METODO DE EMPLEO

Rociar las plantas usando el equipo de aspersión convencional. Para la preparación disuelva completamente la cantidad de **FORTALEZA 40 WP** a usar en un balde y luego deposítelo en el tanque de mezcla que controla agua hasta $\frac{3}{4}$ o la mitad completa el volumen de agua y agite hasta que la mezcla sea homogénea. Agite la mezcla cada vez que haga llenar el equipo.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Para un buen control con **FORTALEZA 40 WP**, en cebolla y frijol, se debe realizar la aplicación con los primeros signos de la enfermedad en campo, para maximizar la eficacia del producto. En arroz, se realiza la aplicación en estado de emisión de la espiga, estado fenológico en que es más susceptible a la enfermedad.

Fecha de actualización: abril de 2020

RECOMENDACIONES BÁSICAS

Leer la etiqueta antes de usar el producto, siga las instrucciones y recomendaciones. Utilice ropa adecuada: Pantalón largo, camisa manga larga, botas, guantes, mascarilla y protector de ojos. No aplique el producto en dirección contraria al viento. No utilice la boca para destapar boquillas. No lave equipos en fuentes de agua. No utilice envases de agroquímicos para uso doméstico. Realice el triple lavado en envases para líquidos.

PRESENTACIONES

40 gr y 400 gr

RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

CULTIVO	PLAGA		Dosis	PC (días)	PR (horas)
	Nombre común	Nombre técnico			
Cebolla	Mancha Púrpura	<i>Alternaria porri</i>	80 -100 g /Ha	7	4
Arroz	Manchado de Grano	<i>Helminthosporium oryzae</i>	75 g/Ha		
Frijol	Antracnosis	<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>	40 g/Ha		

P.C: Período de carencia. Días transcurridos entre la última aplicación y la cosecha.

P.R: Período de reentrada. Periodo de tiempo para el reingreso del personal al área tratada.

Fecha de actualización: abril de 2020