



APACHE 20 EC

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Ingrediente activo: CIPERMETRINA 200 G/l

Registro ICA. 1356

Formulación: Concentrado Emulsionable (CE)

Uso: Insecticida de uso agrícola

IRAC: 3A

MODO DE ACCIÓN

Es un insecticida del grupo de los piretroides, que actúa por contacto e ingestión sobre una gran cantidad de insectos plaga. Se caracteriza por su gran actividad insecticida a muy bajas dosis, por su efecto de choque y por su persistencia.

Es muy resistente al lavado por lluvia por lo que mantiene su actividad biológica más tiempo que otros insecticidas convencionales.

COMPATIBILIDAD

No es compatible con la mayoría de los plaguicidas, especialmente con productos de reacción alcalina. No tiene acción corrosiva sobre los equipos de aplicación

CATEGORIA TÓXICOLOGICA: **II- MODERADAMENTE PELIGROSO**

METODO DE EMPLEO

Rociar las plantas usando el equipo de aspersión convencional. Para la preparación disuelva completamente la cantidad de APACHE 20 EC a usar en el tanque de mezcla, que contenga agua hasta $\frac{3}{4}$ o la mitad; complete el volumen de agua y agite hasta que la mezcla sea homogénea. Agite la mezcla permanentemente. Recuerde calibrar permanentemente el equipo de aspersión y verificar sus boquillas.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

En Tomate, se recomienda la aplicación del producto cuando el nivel de infestación sea mayor a 5% o en el momento del monitoreo existan más de 10 ninfas por planta.

En papa, aplicar al observar la presencia del adulto y/o daño en las hojas de la planta, iniciando las aplicaciones con la dosis de 300 cc/Ha y repetirla con un intervalo de 7 días, posteriormente rotar con productos de diferente grupo IRAC.

Fecha de actualización: abril de 2020

RECOMENDACIONES BÁSICAS

Leer la etiqueta antes de usar el producto, siga las instrucciones y recomendaciones. Utilice ropa adecuada: Pantalón largo, camisa manga larga, botas, guantes, mascarilla y protector de ojos. No aplique el producto en dirección contraria al viento. No utilice la boca para destapar boquillas. No lave equipos en fuentes de agua. No utilice envases de agroquímicos para uso doméstico. Realice el triple lavado en envases para líquidos.

PRESENTACIONES

250 CC Y L

RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

CULTIVO	PLAGA		Dosis	PC (días)	PR (horas)
	Nombre común	Nombre técnico			
Papa	Pulgilla	<i>Epitrix cucumeris</i>	300 cc/ha	14	4
Tomate	Mosca Blanca	<i>(Trialeurodes vaporariorum)</i>			

P.C: Período de carencia. Días transcurridos entre la última aplicación y la cosecha.
 P.R: Período de reentrada. Periodo de tiempo para el reingreso del personal al área tratada.

Fecha de actualización: abril de 2020