



## **CARBENDAZIM POINT** 500 SC

### INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

**Ingrediente activo:** Carbendazim 500 g/l  
**Registro ICA. 3873**  
**Formulación:** Suspensión Concentrada (SC)  
**Uso:** Fungicida de uso agrícola  
**FRAC: 1**

### MODO DE ACCIÓN

Actúa por contacto, como una barrera a la penetración de los hongos patógenos sensibles. El producto también es sistémico. Una vez aplicado, penetra a las hojas de las plantas, donde se transloca en forma apoplástica (con la transpiración) y acropétala (del centro a los bordes). Su acción es preventiva y curativa, controlando a los hongos patógenos antes de su penetración en las plantas, o bien cuando la infección recién se ha producido.

### COMPATIBILIDAD

No es compatible con productos de reacción alcalina. No tiene acción corrosiva sobre los equipos de aplicación. **CARBENDAZIM POINT 500 SC**, es compatible con los plaguicidas de usos comunes. Sin embargo se recomienda hacer pruebas previas para mezclas antes de su utilización.

### CATEGORIA TÓXICOLOGICA: **III- LIGERAMENTE PELIGROSO**

### METODO DE EMPLEO

En arroz se recomienda un volumen de aplicación 150 a 200 litros de agua por hectárea. Efectuar una buena cobertura del follaje, hasta punto de goteo. Mantener los agitadores en funcionamiento durante la aplicación. Para la preparación de la mezcla, llene el tanque hasta la mitad, con el sistema de agitación en movimiento, agregue la cantidad requerida de **CARBENDAZIM POINT 500 SC**, mezclando muy bien, añada el reto del agua

### FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Para un buen control con **CARBENDAZIM POINT 500 SC**, se debe aplicar antes o durante la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad. Se recomienda no aplicar en horas de calor ni con follaje humedecido. En arroz, se aplicar durante el macollamiento (alrededor de los 35 días después de la germinación) y durante el embuchamiento (alrededor de los 75 días después de la germinación).

Fecha de actualización: abril de 2020

## RECOMENDACIONES BÁSICAS

Leer la etiqueta antes de usar el producto, siga las instrucciones y recomendaciones. Utilice ropa adecuada: Pantalón largo, camisa manga larga, botas, guantes, mascarilla y protector de ojos. No aplique el producto en dirección contraria al viento. No utilice la boca para destapar boquillas. No lave equipos en fuentes de agua. No utilice envases de agroquímicos para uso doméstico. Realice el triple lavado en envases para líquidos.

## PRESENTACIONES

250 CC , 1Lt y 20 Lt

## RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS

### CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

CULTIVO	PLAGA		Dosis	PC (días)	PR (horas)
	Nombre común	Nombre técnico			
Arroz	Piricularia	<i>Pyricularia oriza</i>	500 cc /ha	20	12
Papa	Rhizoctoniasis	<i>Rhizoctonia solani Kunh</i>	200 cc /ha	14	
Tomate	Antracnosis	<i>Collethotrichum Sp</i>	30 cc /ha	14	

P.C: Período de carencia. Días transcurridos entre la última aplicación y la cosecha.

P.R: Período de reentrada. Periodo de tiempo para el reingreso del personal al área tratada.

Fecha de actualización: abril de 2020