



# COHETE®

## 75 WP

### INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

**Ingrediente activo:** CIROMAZINA 757,6 g/Kg

**Registro ICA. 808**

**Formulación:** Polvo Mojable (WP)

**Uso:** Insecticida de uso agrícola

**IRAC: 17**

### MODO DE ACCIÓN

COHETE® 75 WP, es un insecticida con base en Cyromazina, del grupo de las triazinas, denominados "reguladores del crecimiento de los insectos", formulado como polvo mojable. Puede ser aplicado en los cultivos de cebolla, tomate y pompón, para el control del minador *Liriomyza* sp. y mosca blanca *Trialeurodes vaporariorum*

### COMPATIBILIDAD

No es compatible con productos de reacción alcalina. No tiene acción corrosiva sobre los equipos de aplicación

CATEGORIA TÓXICOLOGICA: **II- MODERADAMENTE PELIGROSO**

### METODO DE EMPLEO

Rociar las plantas usando el equipo de aspersión convencional. Para la preparación disuelva completamente la cantidad de **COHETE 75 WP** a usar en un balde y luego deposítelo en el tanque de mezcla que controla agua hasta  $\frac{3}{4}$  o la mitad completa el volumen de agua y agite hasta que la mezcla sea homogénea. Agite la mezcla cada vez que haga llenar el equipo.

### FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

se recomienda aplicar sobre campos de Pompón y Cebolla cuando se presente las primeras minas o galerías del minador *Liriomyza* sp se inicia las aplicaciones y se repiten cuando el nivel económico lo amerite. En el caso de tomate, **COHETE 75 WP** controla la mosca blanca *Trialeurodes vaporariorum*, cuando se encuentra que las ninfas del primer instar ocupa el 30 % o más del área de la hoja, se repite cuando el nivel económico lo amerite, teniendo en cuenta que el mismo ingrediente activo no se debe utilizar por más de 2 a tres oportunidades.

Fecha de actualización: abril de 2020

## RECOMENDACIONES BÁSICAS

Leer la etiqueta antes de usar el producto, siga las instrucciones y recomendaciones. Utilice ropa adecuada: Pantalón largo, camisa manga larga, botas, guantes, mascarilla y protector de ojos. No aplique el producto en dirección contraria al viento. No utilice la boca para destapar boquillas. No lave equipos en fuentes de agua. No utilice envases de agroquímicos para uso doméstico. Realice el triple lavado en envases para líquidos.

## PRESENTACIONES

75 Y 250 GR

## RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO**

CULTIVO	PLAGA		Dosis	PC (días)	PR (horas)
	Nombre común	Nombre técnico			
Pompón (Crisantemo)	Minador	<i>(Liriomyza sp)</i>	0.20 – 0.30 g/L	N/A	4
Cebolla			equivalente a 0.120-0.180 kg pc/ha		
Tomate	Mosca Blanca	<i>(Trialeurodes vaporariorum)</i>	0.30 – 0.40 g/L equivalente a 0.180 - 0.240 kg pc/ha	14	

P.C: Período de carencia. Días transcurridos entre la última aplicación y la cosecha.

P.R: Período de reentrada. Periodo de tiempo para el reingreso del personal al área tratada.

N.A.: No aplica.

Fecha de actualización: abril de 2020