



DELTAPOINT® **2.5WP**

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Ingrediente activo: Deltametrina 25 g/kg

Registro ICA: 2270

Formulación: Polvo Mojable (WP)

Uso: Insecticida de uso agrícola

IRAC: 3A

MODO DE ACCIÓN

Es un Insecticida no sistémico con acción de contacto y estomacal que actúa sobre el sistema nervioso de los insectos, bloqueando el paso de los iones de sodio en las membranas de las células nerviosas. Actúa en el sistema nervioso como presináptico compitiendo por los canales de sodio y potasio en el axón de la neurona

COMPATIBILIDAD

DELTAPOINT® 2.5 WP es compatible con la mayoría de los insecticidas y fungicidas de uso corriente, menos con productos de reacción alcalina. En caso de duda se recomienda realizar una prueba en pequeña escala.

CATEGORIA TÓXICOLOGICA: **III-LIGERAMENTE TOXICO**

METODO DE EMPLEO

Diluir la cantidad recomendada en un poco de agua, agitando constantemente. Completar luego esta mezcla con el resto del agua hasta obtener el volumen deseado y mantener la agitación. Observe cuidadosamente las instrucciones de empleo antes de utilizar DELTAPOINT® 2.5 WP.

DELTAPOINT® 2.5 WP., no es tóxico a las plantas de cultivos, siempre que se aplique siguiendo las dosis recomendadas; sin embargo, se recomienda hacer una prueba previa antes de su utilización.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar dentro de un Programa de Manejo Integrado de Plagas (MIP), efectuando una aplicación inicial cuando se superes el umbral económico, y observar la dinámica de la plaga para determinar si es necesario una segunda aplicación. Rote con otros productos con diferente modo de acción para evitar el desarrollo de la resistencia

Fecha de actualización: abril de 2020

RECOMENDACIONES BÁSICAS

Lea la etiqueta y siga las instrucciones y recomendaciones del producto. Utilice ropa adecuada: Pantalón largo, camisa manga larga, botas, guantes, mascarilla y protector de ojos. No aplique el producto en dirección contraria al viento. No utilice la boca para destapar boquillas. No lave equipos en fuentes de agua. No utilice envases de agroquímicos para uso doméstico. Realice el triple lavado en envases para líquidos.

PRESENTACIONES

kilo

RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

CULTIVO	PLAGA		Dosis	PC (días)	PR (horas)
	Nombre común	Nombre técnico			
Papa	"Pulguilla"	<i>Epitrix cucumeris</i>	350 g/ha	14	4
Pastos	"Chinche de los Pastos"	<i>Collaria escenica</i>		21	

P.R. Período de Reentrada: **REI:** tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación de un plaguicida y el ingreso de personas al área o cultivo tratado. En caso de ser necesario el ingreso antes del tiempo determinado como periodo de reentrada, se debe usar pantalón largo, camisa manga larga, calzado cerrado y para las labores que impliquen contacto de las manos con el área tratada, se debe usar adicionalmente guantes y en ambientes confinados (invernaderos) se debe usar mascara o respirador

Fecha de actualización: abril de 2020