

## **GATILLO**<sup>®</sup> **350 SC**

### INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

**Ingrediente activo: Imidacloprid 350 g/L**

**Registro ICA: 804**

**Formulación:** Suspensión Concentrada (SC)

**Uso:** Insecticida de uso agrícola

**IRAC: 4A**

### MODO DE ACCIÓN

Es un insecticida perteneciente al grupo químico de los neonicotinoides, que actúa por contacto e ingestión sobre insectos chupadores en diversos cultivos. Se caracteriza por sus excelentes propiedades sistémicas y un largo efecto residual que puede durar hasta 3 semanas. Se aplica foliarmente al igual que puede emplearse en sistemas de riego o en drench en cantidades muy pequeñas que facilitan el manejo.

### COMPATIBILIDAD

No es compatible con la mayoría de los plaguicidas, especialmente con productos de reacción alcalina. No tiene acción corrosiva sobre los equipos de aplicación.

CATEGORIA TÓXICOLOGICA: **II- MODERADAMENTE PELIGROSO**

### METODO DE EMPLEO

Rociar las plantas usando el equipo de aspersion convencional. Para la preparación disuelva completamente la cantidad de APACHE 20 EC a usar en el tanque de mezcla, que contenga agua hasta  $\frac{3}{4}$  o la mitad; complete el volumen de agua y agite hasta que la mezcla sea homogénea. Agite la mezcla permanentemente. Recuerde calibrar permanentemente el equipo de aspersion y verificar sus boquillas

### FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

El número de aplicaciones y momentos de aplicación estará en función a las condiciones climáticas y características de manejo del cultivo. En Pompón, llevar acabo monitoreo para establecer presencia de la plaga. En Papa, iniciar aplicaciones cuando se observen adultos.

Fecha de actualización: abril de 2020

## RECOMENDACIONES BÁSICAS

Lea la etiqueta y siga las instrucciones y recomendaciones del producto. Utilice ropa adecuada: Pantalón largo, camisa manga larga, botas, guantes, mascarilla y protector de ojos. No aplique el producto en dirección contraria al viento. No utilice la boca para destapar boquillas. No lave equipos en fuentes de agua. No utilice envases de agroquímicos para uso doméstico. Realice el triple lavado en envases para líquidos.

## PRESENTACIONES

250 CC 1 Litro y 20 litros

## RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO					
CULTIVO	PLAGA		Dosis	PC (días)	PR (horas)
	Nombre común	Nombre técnico			
PAPA	Mosca Blanca	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	0,25 – 0,50 cc/L	3	4
POMPOM			a 150 -300 cc /ha		

P.C: Período de carencia. Días transcurridos entre la última aplicación y la Cosecha.

P.R: Período de reentrada. Periodo de tiempo para el reingreso del personal al área tratada.

N.A.: No aplica.

Fecha de actualización: abril de 2020