



OFICIAL® **250 EW**

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Ingrediente activo: Tebuconazole 250 g/l

Registro ICA. 796

Formulación: Emulsión Aceite en Agua (EW)

Uso: Fungicida de uso agrícola

FRAC: 3

MODO DE ACCIÓN

Es un fungicida sistémico perteneciente al grupo de los Triazoles con acción preventiva, curativa y erradicante. Por su actividad sistémica, proporciona un buen control no sólo de las enfermedades presentes en la superficie externa de la planta sino también de las que se encuentran en su interior. Tiene una alta movilidad dentro de la planta llegando a los todos los sitios donde se encuentran los patógenos a controlar. Es rápidamente absorbido por los tejidos vegetales de las plantas y se trasloca en manera acropétala. En el suelo se degrada con rapidez y no se acumula. Es poco móvil y por tanto no se lixivia. En el agua se le considera poco persistente.

COMPATIBILIDAD

es compatible con la mayoría de los insecticidas y fungicidas de uso corriente; en caso de duda se recomienda realizar una prueba en pequeña escala. No es compatible con productos de reacción alcalina..

CATEGORIA TÓXICOLOGICA: **III- MODERADAMENTE PELIGROSO**

METODO DE EMPLEO

Rociar las plantas usando el equipo de aspersión convencional. Para la preparación de la mezcla, llene el tanque hasta la mitad, con el sistema de agitación en movimiento, agregue la cantidad requerida de **Oficial 250 EW**, mezclando muy bien, añada el resto del agua.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

De acuerdo con la susceptibilidad de las variedades y de las condiciones ambientales predominantes, en Arroz las aplicaciones se deben hacer en la época de floración y es recomendable de acuerdo con el nivel de infección presente, realizar una segunda aplicación rotando con otros ingredientes activos. Para el caso de papa se deben realizar aplicaciones sistemáticas en intervalos 14 días, fundamentalmente desde floración en adelante.

Fecha de actualización: abril de 2020

RECOMENDACIONES BÁSICAS

Leer la etiqueta antes de usar el producto, siga las instrucciones y recomendaciones. Utilice ropa adecuada: Pantalón largo, camisa manga larga, botas, guantes, mascarilla y protector de ojos. No aplique el producto en dirección contraria al viento. No utilice la boca para destapar boquillas. No lave equipos en fuentes de agua. No utilice envases de agroquímicos para uso doméstico. Realice el triple lavado en envases para líquidos.

PRESENTACIONES

250 CC , 1Lt

RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

CULTIVO	PLAGA		Dosis	PC (días)	PR (horas)
	Nombre común	Nombre técnico			
Arroz	Manchado de Grano	<i>Helminthosporium oryzae</i> , <i>Cercospora oryzae</i> , <i>Sarocladium oryzae</i> y <i>Rhynchoporium oryzae</i>	0.5 – 0.6 L/ha	35	4
Papa	Alternaria	<i>Alternaria solani</i>	0.45 – 0.90 L/ha	7	

P.C: Período de carencia. Días transcurridos entre la última aplicación y la cosecha.

P.R: Período de reentrada. Periodo de tiempo para el reingreso del personal al área tratada.

Fecha de actualización: abril de 2020