



PATRIARCA[®] 325 SC

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Ingrediente activo: Azoxistrobin 200 g/l y Difenoconazole 125 g/l

Registro ICA. 1224

Formulación: Suspensión Concentrada (SC)

Uso: Fungicida de uso agrícola

FRAC: 11 y 13

MODO DE ACCIÓN

Es un fungicida con doble mecanismos de acción, sistémica y curativa perteneciente al grupo de las estrobilurinas y triazoles, que actúa de forma contundente en cualquier etapa de desarrollo del hongo. Mantiene el control por más tiempo al prolongar la acción residual, ya que forma una zona de alta concentración cerca al sitio de entrada del hongo.

Es un fungicida curativo de alto espectro que controla infecciones ya establecidas en la planta. Es protectante pues inhibe la germinación de esporas.

COMPATIBILIDAD

No es compatibles con productos de reacción alcalina. No tiene acción corrosiva sobre los equipos de aplicación

CATEGORIA TÓXICOLOGICA: III- LIGERAMENTE PELIGROSO

METODO DE EMPLEO

Rociar las plantas usando el equipo de aspersión convencional. Para la preparación disuelva completamente la cantidad de **PATRIARCA 325 SC** a usar en el tanque de mezcla, que contenga agua hasta $\frac{3}{4}$ o la mitad; complete el volumen de agua y agite hasta que la mezcla sea homogénea. Agite la mezcla permanentemente. Recuerde calibrar permanentemente el equipo de aspersión y verificar sus boquillas.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Para un buen control con **PATRIARCA 325 SC**, se debe aplicar antes o durante la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad. Se recomienda no aplicar en horas de calor ni con follaje humedecido. En arroz, se realiza una aplicación durante la época de embuchamiento, aplicar la dosis baja en condiciones de poca precipitación y humedad y la dosis alta cuando existan condiciones ambientales que favorezcan el desarrollo de la enfermedad. En Papa, se recomienda realizar una aplicación directa al tubérculo-semilla, al surco en el momento de la siembra. En tomate, se debe realizar una aplicación en los primeros signos de la enfermedad. Se realiza una aplicación por ciclo de cultivo. **PATRIARCA 325 SC**, debe incluirse dentro de un programa de rotación con otros fungicidas de mecanismo y modo de acción diferente.

Fecha de actualización: abril de 2020

RECOMENDACIONES BÁSICAS

Leer la etiqueta antes de usar el producto, siga las instrucciones y recomendaciones. Utilice ropa adecuada: Pantalón largo, camisa manga larga, botas, guantes, mascarilla y protector de ojos. No aplique el producto en dirección contraria al viento. No utilice la boca para destapar boquillas. No lave equipos en fuentes de agua. No utilice envases de agroquímicos para uso doméstico. Realice el triple lavado en envases para líquidos.

PRESENTACIONES

250 CC , 1Lt

RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

CULTIVO	PLAGA		Dosis	PC (días)	PR (horas)
	Nombre común	Nombre técnico			
Arroz	Manchado de Grano	<i>Helminthosporium Oryzae</i> , <i>Cercospora Oryzae</i> , <i>Sarocladium Oryzae</i> , <i>Rhynchosporium oryzae</i>	400 – 500 cc/Ha	15	4
Papa	Costra Negra	<i>Rhizoctonia solani</i>	1 L/Ha	23	
Tomate	Tizón Temprano	<i>Alternaria solani</i>	375 cc/Ha	7	
Crisantemo	Moho gris	<i>Botrytis cinérea</i>	850 cc/Ha x 2 aplicaciones	N.A.	

Fecha de actualización: abril de 2020