



## **PODEROSO®** **250 SC**

### INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

**Ingrediente activo:** Lambdacyhalothrin 106 g/L + Thiamethoxam 141 g/L

**Registro ICA:** 2552

**Formulación:** Suspensión concentrada (SC)

**Uso:** Insecticida de uso agrícola

**Grupos IRAC:** 3 y 4A

### MODO DE ACCIÓN

**PODEROSO 250 SC** es un insecticida que contiene Lambdacyhalothrin y Thiamethoxam. El primero actúa por contacto e ingestión, bloqueando el paso de los iones de sodio en las membranas de las células nerviosas provocando parálisis o la muerte del insecto. Thiamethoxam es un insecticida sistémico que actúa por contacto e ingestión. En el sistema nervioso central se enlaza a los receptores post sinápticos nicotinérgicos de acetilcolina causando bloqueos irreversibles lo que conlleva a la disrupción de la transmisión nerviosa y a una descontrolada descarga de los nervios. Una vez aplicado, los insectos cesan de alimentarse en unas horas y mueren poco después.

### COMPATIBILIDAD

En caso de requerirse mezcla con otro producto, se recomienda hacer una prueba a escala antes de la aplicación.

Antes de mezclar **PODEROSO® 250 SC** con otros insecticidas se recomienda efectuar pruebas preliminares de compatibilidad. Si se utiliza este producto a las dosis recomendadas en esta etiqueta no es de esperar que se presenten problemas de fitotoxicidad.

**CATEGORIA TÓXICOLOGICA: II MODERADAMENTE PELIGROSO.**

### METODO DE EMPLEO

Mézclese la cantidad necesaria de **PODEROSO® 250 SC** con agua limpia en el tanque de la aspersora. CALIBRE EL EQUIPO DE ASPERSIÓN ANTES DE LA APLICACIÓN.

### FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Se debe efectuar el número de aplicaciones indicadas en el cuadro de dosis al observar la presencia de larvas. No aplicar cuando las condiciones ambientales favorezcan el arrastre de la aspersión sobre las áreas tratadas. No es recomendable realizar la aplicación con altas temperaturas o con humedad relativa baja.

Fecha de actualización: abril de 2020



## RECOMENDACIONES BÁSICAS

Lea la etiqueta y siga las instrucciones y recomendaciones del producto. Utilice ropa adecuada: Pantalón largo, camisa manga larga, botas, guantes, mascarilla y protector de ojos. No aplique el producto en dirección contraria al viento. No utilice la boca para destapar boquillas. No lave equipos en fuentes de agua. No utilice envases de agroquímicos para uso doméstico. Realice el triple lavado en envases para líquidos.

## PRESENTACIONES

Frasco de 1 L  
Frasco de 250 cc

## RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO**

CULTIVO	PLAGA		Dosis	PC (días)	PR (horas)
	Nombre común	Nombre técnico			
Papa	Gusano Blanco	<i>Premnotrypes vorax H</i>	0.250 L/Ha x 1 aplicación	10	4

Aplicar el Poderoso SC a la dosis de 0,250 L/Ha para un volumen de 200 litros/Ha (1 caneca), dirigido a la base de las plantas. En caso de alta incidencia de la plaga donde se necesite realizar más de una aplicación rotar con productos de diferente mecanismo de acción.

PC.: Periodo de Carencia.

PR.: Período Reingreso

Fecha de actualización: abril de 2020