

ULTIMATUM[®] **5 EC**

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Ingrediente activo: Lufenuron 50 g/L

Registro ICA: 989

Formulación: Concentrado Emulsionable (EC)

Uso: Insecticida de uso agrícola

IRAC: 15

MODO DE ACCIÓN

ULTIMATUM 5 EC pertenece al grupo de las benzoilureas, compuestos que inhiben la síntesis de quitina, probablemente por mecanismos de interferencia enzimática, impidiendo la muda de las larvas de invertebrados y disminuyendo su alimentación. También actúan reduciendo la fecundidad y la capacidad de los huevos para eclosionar tras la ingestión por parte de adultos de los géneros Lepidoptera, Coleoptera, Diptera y Thysanoptera, y tiene efecto ovicida sobre los huevos recién puestos de algunas plagas dentro de los géneros Lepidoptera, Coleoptera y Thysanoptera..

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los insecticidas y fungicidas de uso corriente; en caso de duda se recomienda realizar una prueba en pequeña escala. No es compatible con productos de reacción alcalina.

CATEGORIA TÓXICOLOGICA: III- LIGERAMENTE PELIGROSO

METODO DE EMPLEO

Rociar las plantas usando el equipo de aspersión convencional. Para la preparación disuelva completamente la cantidad de ULTIMATUM 5 EC a usar en el tanque de mezcla, que contenga agua hasta $\frac{3}{4}$ o la mitad; complete el volumen de agua y agite hasta que la mezcla sea homogénea. Agite la mezcla permanentemente. Recuerde calibrar permanentemente el equipo de aspersión y verificar sus boquillas.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

En tomate, se recomienda la aplicación del producto cuando se detecte la presencia de dos larvas por planta. En caso de requerirse aplicaciones adicionales se recomienda rotar con insecticidas de diferente mecanismo de acción.

Fecha de actualización: abril de 2020

En soya, se recomienda la aplicación del producto cuando se detecte la presencia de dos (2) larvas por planta. En caso de requerirse aplicaciones adicionales se recomienda rotar con insecticidas de diferente mecanismo de acción.

RECOMENDACIONES BÁSICAS

Leer la etiqueta antes de usar el producto, siga las instrucciones y recomendaciones. Utilice ropa adecuada: Pantalón largo, camisa manga larga, botas, guantes, mascarilla y protector de ojos. No aplique el producto en dirección contraria al viento. No utilice la boca para destapar boquillas. No lave equipos en fuentes de agua. No utilice envases de agroquímicos para uso doméstico. Realice el triple lavado en envases para líquidos.

PRESENTACIONES

250 CC 1 Litro.

RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

CULTIVO	PLAGA		Dosis	PC (días)	PR (horas)
	Nombre común	Nombre técnico			
TOMATE	GUSANO COGOLLERO	<i>Tuta absoluta</i>	200 cc/ha	7	4
SOYA	DEFOLIADOR DE LA SOYA	<i>Anticarsia gemmatalis</i>	100 cc/ha	30	

P.C: Período de carencia. Días transcurridos entre la última aplicación y la cosecha.

P.R: Período de reentrada. Periodo de tiempo para el reingreso del personal al área tratada.

Fecha de actualización: abril de 2020