



## **APACHE** 20 EC

### INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

**Ingrediente activo:** Cipermetrina 200 g/L

**Registro ICA. 1356**

**Formulación:** Concentrado Emulsionable (EC)

**Uso:** Insecticida de uso agrícola

**IRAC: 3A**

### MODO DE ACCIÓN

Es un insecticida del grupo de los piretroides, que actúa por contacto e ingestión sobre una gran cantidad de insectos plaga. Se caracteriza por su gran actividad insecticida a muy bajas dosis, por su efecto de choque y su persistencia.

Es muy resistente al lavado por lluvia por lo que mantiene su actividad de control por más tiempo que otros insecticidas convencionales.

### COMPATIBILIDAD

No es compatible con la mayoría de los plaguicidas, especialmente con productos de reacción alcalina. Se recomienda realizar previamente a la mezcla de tanque una prueba de compatibilidad física con otros productos usando las dosis recomendadas en la etiqueta. No tiene acción corrosiva sobre los equipos de aplicación.

### CATEGORIA TÓXICOLOGICA: **II- MODERADAMENTE PELIGROSO**

### METODO DE EMPLEO

Aplicar usando el equipo de aspersión convencional. Para la preparación disuelva completamente la cantidad de APACHE 20 EC a usar en el tanque de mezcla, que contenga agua hasta  $\frac{3}{4}$  o la mitad; complete el volumen de agua y agite hasta que la mezcla sea homogénea. Agite la mezcla constantemente. Recuerde calibrar permanentemente el equipo de aspersión y verifique las boquillas.

### FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

En Tomate, se recomienda la aplicación del producto cuando el nivel de infestación sea mayor a 5% o en el momento del monitoreo existan más de 10 ninfas por planta.

En papa, aplicar al observar la presencia del adulto y/o daño en las hojas de las plantas, realizando la aplicación con la dosis de 300 cc/ha, posteriormente rotar con productos de diferente grupo químico.

Fecha de actualización: Agosto de 2023

## RECOMENDACIONES BÁSICAS

Leer la etiqueta antes de usar el producto, siga las instrucciones y recomendaciones. Utilice ropa adecuada: Pantalón largo, camisa manga larga, botas, guantes, mascarilla y protector de ojos. No aplique el producto en dirección contraria al viento. No utilice la boca para destapar boquillas. No lave equipos en fuentes de agua. No utilice envases de agroquímicos para uso doméstico. Realice el triple lavado en envases para líquidos.

## PRESENTACIONES

250 cc y 1 L

## RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS

### CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

CULTIVO	PLAGA		Dosis	PC (días)	PR (horas)
	Nombre común	Nombre técnico			
Papa	Pulgilla	<i>Epitrix cucumeris</i>	300 cc/ha	14	4
Tomate	Mosca Blanca	<i>(Trialeurodes vaporariorum)</i>			

P.C: Período de carencia. Días transcurridos entre la última aplicación y la cosecha.  
P.R: Período de reentrada. Periodo de tiempo para el reingreso del personal al área tratada.

Fecha de actualización: Agosto de 2023