



CARBENDAZIM POINT 500 SC

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Ingrediente activo: Carbendazim 500 g/L
Registro Nacional ICA: 2111
Formulación: Suspensión Concentrada (SC)
Uso: Fungicida de uso agrícola
FRAC: 1

MODO DE ACCIÓN

Es un fungicida sistémico y de contacto, con acción protectante y curativa, que actúa de manera directa sobre las zoosporas inhibiendo la tubulina, componente fundamental de los microtúbulos del huso acromático. Al inhibir la mitosis detiene el desarrollo del tubo germinativo, dando lugar a células anormales que provocan la muerte del hongo deteniendo el avance de la enfermedad.

COMPATIBILIDAD

No es compatible con productos de reacción alcalina. No tiene acción corrosiva sobre los equipos de aplicación. CARBENDAZIM POINT 500 SC es compatible con los plaguicidas de usos comunes. Se recomienda realizar previamente a la mezcla de tanque una prueba de compatibilidad física con otros productos usando las dosis recomendadas en la etiqueta.

CATEGORIA TÓXICOLOGICA: **III - LIGERAMENTE PELIGROSO**

METODO DE EMPLEO

En arroz se recomienda un volumen de aplicación de 200 L de agua por hectárea. Efectuar una buena cobertura del follaje, hasta punto de goteo. Mantener los agitadores en funcionamiento durante la aplicación. Para la preparación de la mezcla, llene el tanque hasta la mitad, con el sistema de agitación en movimiento, agregue la cantidad requerida de CARBENDAZIM POINT 500 SC mezclando muy bien, y complete el volumen restante con agua.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Para un buen control con CARBENDAZIM POINT 500 SC se debe aplicar antes o durante la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad. Se recomienda no aplicar en horas de calor ni con follaje humedecido. En arroz, se aplicar durante el macollamiento (alrededor de los 35 días después de la germinación) y durante el embuchamiento (alrededor de los 75 días después de la germinación).

Fecha de actualización: Agosto de 2023

RECOMENDACIONES BÁSICAS

Leer la etiqueta antes de usar el producto, siga las instrucciones y recomendaciones. Utilice ropa adecuada: Pantalón largo, camisa manga larga, botas, guantes, mascarilla y protector de ojos. No aplique el producto en dirección contraria al viento. No utilice la boca para destapar boquillas. No lave equipos en fuentes de agua. No utilice envases de agroquímicos para uso doméstico. Realice triple lavado al envase, inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para su gestión.

PRESENTACIONES

250 cc, 1 L, 4 L, 20 L y 200 L

RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

CULTIVO	PLAGA		Dosis	PC (días)	PR (horas)
	Nombre común	Nombre técnico			
Arroz	Piricularia	<i>Pyricularia orizae</i>	500 cc /ha	20	
Papa	Rhizoctoniasis	<i>Rhizoctonia solani Kuhn</i>	200 cc /ha	14	4
Tomate	Antracnosis	<i>Colletotrichum sp.</i>	30 cc /ha	14	

P.C: Período de carencia. Días transcurridos entre la última aplicación y la cosecha.

P.R: Período de reentrada. Periodo de tiempo para el reingreso del personal al área tratada.

Fecha de actualización: Agosto de 2023