



## **COHETE**<sup>®</sup> 75 WP

### INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

**Ingrediente activo:** Cyromazina 757,6 g/kg

**Registro Nacional ICA: 808**

**Formulación:** Polvo Mojable (WP)

**Uso:** Insecticida de uso agrícola

**IRAC: 17**

### MODO DE ACCIÓN

COHETE 75 WP es un insecticida con actividad sistémica translamina, y acción por ingestión con efecto transovarial en hembras, que interfiere en el crecimiento de los insectos alterando su ciclo biológico mediante la regulación del proceso de muda en los diferentes estados de desarrollo, lo que conlleva a la deformación o muerte de larvas, pupas o adultos.

### COMPATIBILIDAD

No es compatible con productos de reacción alcalina. Se recomienda realizar previamente a la mezcla de tanque una prueba de compatibilidad física con otros productos usando las dosis recomendadas en la etiqueta. No tiene acción corrosiva sobre los equipos de aplicación.

**CATEGORIA TÓXICOLOGICA: II - MODERADAMENTE PELIGROSO**

### METODO DE EMPLEO

Aplique usando equipos de aspersión convencionales. Para la preparación disuelva completamente la cantidad de COHETE 75 WP a usar en un balde y luego deposítelo en el tanque de mezcla que controla agua hasta  $\frac{3}{4}$  o la mitad completa el volumen de agua y agite hasta que la mezcla sea homogénea. Agite la mezcla varias veces durante la aplicación.

### FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar sobre campos de Pompón y Cebolla cuando se presente las primeras minas o galerías del minador *Liriomyza* sp se inicia las aplicaciones y se repiten cuando el nivel de daño económico lo amerite. En el caso de tomate, COHETE 75 WP controla la mosca blanca *Trialeurodes vaporariorum*, cuando se encuentra que las ninfas del primer instar ocupa el 30% o más del área de la hoja, realizando rotaciones con ingredientes activos de diferentes grupos químicos.

Fecha de actualización: Agosto de 2023

## RECOMENDACIONES BÁSICAS

Leer la etiqueta antes de usar el producto, siga las instrucciones y recomendaciones. Utilice ropa adecuada: Pantalón largo, camisa manga larga, botas, guantes, mascarilla y protector de ojos. No aplique el producto en dirección contraria al viento. No utilice la boca para destapar boquillas. No lave equipos en fuentes de agua. No utilice envases de agroquímicos para uso doméstico. Realice triple lavado al envase, inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para su gestión.

## PRESENTACIONES

75 g y 250 g

## RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO**

CULTIVO	PLAGA		Dosis	PC (días)	PR (horas)
	Nombre común	Nombre técnico			
Pompón (Crisantemo)	Minador	<i>(Liriomyza sp)</i>	0.20 – 0.30 g/L	N/A	4
Cebolla			equivalente a 0.120-0.180 kg pc/ha		
Tomate	Mosca Blanca	<i>(Trialeurodes vaporariorum)</i>	0.30 – 0.40 g/L equivalente a 0.180 - 0.240 kg pc/ha	14	

P.C: Período de carencia. Días transcurridos entre la última aplicación y la cosecha.

P.R: Período de reentrada. Periodo de tiempo para el reingreso del personal al área tratada.

N.A.: No aplica.

Fecha de actualización: Agosto de 2023