



DELTAPOINT® **2.5 WP**

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Ingrediente activo: Deltametrina 25 g/kg

Registro Nacional ICA: 2270

Formulación: Polvo Mojable (WP)

Uso: Insecticida de uso agrícola

IRAC: 3A

MODO DE ACCIÓN

Es un insecticida no sistémico con acción de contacto y estomacal que actúa sobre el sistema nervioso de los insectos, bloqueando el paso de los iones de sodio en las membranas de las células nerviosas. Actúa en el sistema nervioso como presináptico compitiendo por los canales de sodio y potasio en el axón de la neurona

COMPATIBILIDAD

DELTAPOINT® 2.5 WP es compatible con la mayoría de los insecticidas y fungicidas de uso agrícola, a excepción de productos de reacción alcalina. Se recomienda realizar previamente a la mezcla de tanque una prueba de compatibilidad física con otros productos usando las dosis recomendadas en la etiqueta. No tiene acción corrosiva sobre los equipos de aplicación.

CATEGORIA TÓXICOLOGICA: **III-LIGERAMENTE TOXICO**

METODO DE EMPLEO

Realice una premezcla del producto con una fracción del agua a utilizar, agitando constantemente. Luego agregue esta mezcla al tanque de aplicación hasta obtener el volumen deseado, y mantener la agitación. Lea cuidadosamente las instrucciones de empleo antes de utilizar DELTAPOINT® 2.5 WP.

DELTAPOINT® 2.5 WP no presenta fitotoxicidad sobre los cultivos recomendados siempre y cuando se aplique siguiendo las dosis de la etiqueta. Se sugiere realizar una prueba previa antes de utilizarlo a mayor escala.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar dentro de un Programa de Manejo Integrado de Plagas (MIP), efectuando una aplicación inicial cuando se evidencien los primeros daños en el cultivo, realizando el debido seguimiento a las poblaciones de la plaga para determinar si es necesario una segunda aplicación. Rote con otros productos de diferente modo de acción para evitar el desarrollo de resistencia al grupo químico.

Fecha de actualización: Agosto de 2023

RECOMENDACIONES BÁSICAS

Lea la etiqueta y siga las instrucciones y recomendaciones del producto. Utilice ropa adecuada: Pantalón largo, camisa manga larga, botas, guantes, mascarilla y protector de ojos. No aplique el producto en dirección contraria al viento. No utilice la boca para destapar boquillas. No lave equipos en fuentes de agua. No utilice envases de agroquímicos para uso doméstico. Realice triple lavado al envase, inutilícelo triturándolo o perforándolo y dépositelo en el lugar destinado por las autoridades para su gestión.

PRESENTACIONES

250 g, 1 kg

RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

CULTIVO	PLAGA		Dosis	PC (días)	PR (horas)
	Nombre común	Nombre técnico			
Papa	Pulguilla	<i>Epitrix cucumeris</i>	350 g/ha	14	4
Pastos	Chinche de los Pastos	<i>Collaria scenica</i>		21	

P.C: Período de carencia. Días transcurridos entre la última aplicación y la cosecha.

P.R. Período de Reentrada: tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación de un plaguicida y el ingreso de personas al área o cultivo tratado. En caso de ser necesario el ingreso antes del tiempo determinado como periodo de reentrada, se debe usar pantalón largo, camisa manga larga, calzado cerrado y para las labores que impliquen contacto de las manos con el área tratada, se debe usar adicionalmente guantes y en ambientes confinados (invernaderos) se debe usar mascara o respirador.

Fecha de actualización: Agosto de 2023