



FINIQUITAR[®] 500 SC

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Ingrediente activo: Iprodione 500 g/L
Registro Nacional ICA: 1223
Formulación: Suspensión Concentrada (SC)
Uso: Fungicida de uso agrícola
FRAC: Grupo 2

MODO DE ACCIÓN

Es un fungicida de amplio espectro con efecto preventivo-curativo que actúa inhibiendo la germinación de conidias y el crecimiento micelial. Presenta un efecto de atrofiamiento sobre las hifas y tubos germinativos, al igual que una plasmólisis. Actúa sobre el metabolismo de los lípidos y la síntesis de ADN.

COMPATIBILIDAD

Se recomienda realizar previamente a la mezcla de tanque una prueba de compatibilidad física con otros productos usando las dosis recomendadas en la etiqueta. No tiene acción corrosiva sobre los equipos de aplicación. No es compatible con productos de reacción alcalina.

CATEGORIA TÓXICOLOGICA: **II- MODERADAMENTE PELIGROSO**

METODO DE EMPLEO

Aplicar usando el equipo de aspersión convencional. Para la preparación disuelva completamente la cantidad de **FINIQUITAR 500 SC** a usar en el tanque de mezcla, que contenga agua hasta $\frac{3}{4}$ o la mitad; complete el volumen de agua y agite hasta que la mezcla sea homogénea. Agite la mezcla permanentemente. Recuerde calibrar el equipo de aspersión y verificar sus boquillas antes de realizar la aplicación.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Para un buen control con **FINIQUITAR 500 SC**, en papa, se debe realizar dos aplicaciones con intervalos de 7 días en presencia de la enfermedad. Se recomienda no aplicar en horas de alta temperatura ni con follaje húmedo. En Papa, se utiliza la dosis baja en condiciones de baja presión de la enfermedad, y la dosis alta cuando se presenten niveles de infestación alta o cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. En tomate, se debe iniciar la aplicación con los primeros síntomas de la enfermedad. Se realiza máximo dos aplicaciones consecutivas por ciclo de cultivo. En Crisantemo, iniciar las aplicaciones con los primeros síntomas de la enfermedad. **FINIQUITAR 500 SC** debe incluirse dentro de un programa de rotación con otros fungicidas de mecanismo y modo de acción diferente.

Fecha de actualización: Agosto de 2023

RECOMENDACIONES BÁSICAS

Leer la etiqueta antes de usar el producto, siga las instrucciones y recomendaciones. Utilice ropa adecuada: Pantalón largo, camisa manga larga, botas, guantes, mascarilla y protector de ojos. No aplique el producto en dirección contraria al viento. No utilice la boca para destapar boquillas. No lave equipos en fuentes de agua. No utilice envases de agroquímicos para uso doméstico. Realice triple lavado al envase, inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para su gestión.

PRESENTACIONES

250 cc , 1 L, 200 L

RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

CULTIVO	PLAGA		Dosis	PC (días)	PR (horas)
	Nombre común	Nombre técnico			
Papa	Tizón temprano	<i>Alternaria solani</i>	400-500 cc/Ha	7	4
Tomate			800 cc/Ha	7	
Crisantemo	Moho Gris	<i>Botrytis cinerea</i>	1 L/Ha	NA	

P.C: Período de carencia. Días transcurridos entre la última aplicación y la cosecha.

P.R: Período de reentrada. Periodo de tiempo para el reingreso del personal al área tratada.

N.A.: No aplica.

Fecha de actualización: Agosto de 2023