



## **FORTALEZA**<sup>®</sup> 40 WP

### INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

**Ingrediente activo:** Myclobutanil 400 g/kg

**Registro Nacional ICA:** 1242

**Formulación:** Polvo Mojable (WP)

**Uso:** Fungicida de uso agrícola

**FRAC:** Grupo 3

### MODO DE ACCIÓN

FORTALEZA<sup>®</sup> 40 WP es un fungicida con efecto preventivo, curativo y erradicante. Su acción afecta la síntesis de la membrana celular; causa la muerte del haustorio (micelio de penetración), tan pronto como es emitido. En infecciones presentes detiene el crecimiento del micelio, y así también previene la esporulación por la muerte temprana del micelio, impidiendo la colonización del hongo, el avance de la infección en los tejidos, y su posterior dispersión.

### COMPATIBILIDAD

No es compatible con productos de reacción alcalina. Se recomienda realizar previamente a la mezcla de tanque una prueba de compatibilidad física con otros productos usando las dosis recomendadas en la etiqueta. No tiene acción corrosiva sobre los equipos de aplicación.

### CATEGORIA TÓXICOLOGICA: **III- LIGERAMENTE PELIGROSO**

### METODO DE EMPLEO

Aplicar usando el equipo de aspersión convencional. Para la preparación disuelva completamente la cantidad de **FORTALEZA 40 WP** a usar en un balde y luego deposítelo en el tanque de mezcla que contenga agua hasta  $\frac{3}{4}$  o la mitad, completar el volumen de agua y agite hasta que la mezcla sea homogénea. Agite la mezcla continuamente.

### FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Para un buen control con **FORTALEZA 40 WP**, en cebolla y frijol, se debe realizar la aplicación con los primeros síntomas de la enfermedad para maximizar la eficacia del producto. En arroz, se realiza la aplicación en estado de emisión de la espiga, estado fenológico en el que la planta es más susceptible a la enfermedad.

Fecha de actualización: Agosto de 2023

## RECOMENDACIONES BÁSICAS

Leer la etiqueta antes de usar el producto, siga las instrucciones y recomendaciones. Utilice ropa adecuada: Pantalón largo, camisa manga larga, botas, guantes, mascarilla y protector de ojos. No aplique el producto en dirección contraria al viento. No utilice la boca para destapar boquillas. No lave equipos en fuentes de agua. No utilice envases de agroquímicos para uso doméstico. Realice triple lavado al envase, inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para su gestión.

## PRESENTACIONES

40 g y 400 g

## RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO**

CULTIVO	PLAGA		Dosis	PC (días)	PR (horas)
	Nombre común	Nombre técnico			
Cebolla	Mancha Púrpura	<i>Alternaria porri</i>	80 - 100 g /Ha	7	4
Arroz	Manchado de Grano	<i>Helminthosporium oryzae</i>	75 g/Ha		
Frijol	Antracnosis	<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>	40 g/Ha		

P.C: Período de carencia. Días transcurridos entre la última aplicación y la cosecha.

P.R: Período de reentrada. Periodo de tiempo para el reingreso del personal al área tratada.

Fecha de actualización: Agosto de 2023