



GATILLO[®] **350 SC**

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Ingrediente activo: Imidacloprid 350 g/L

Registro Nacional ICA: 804

Formulación: Suspensión Concentrada (SC)

Uso: Insecticida de uso agrícola

IRAC: 4A

MODO DE ACCIÓN

Es un insecticida perteneciente al grupo químico de los neonicotinoides que actúa por contacto e ingestión sobre insectos chupadores en diversos cultivos. Se caracteriza por sus excelentes propiedades sistémicas y un largo efecto residual que puede durar hasta 3 semanas. Actúa sobre el sistema nervioso central interviniendo sobre los receptores nicotínicos de la acetilcolina en las células nerviosas de los insectos, causando su parálisis y posteriormente la muerte.

COMPATIBILIDAD

No es compatible con productos de reacción alcalina. Se recomienda realizar previamente a la mezcla de tanque una prueba de compatibilidad física con otros productos usando las dosis recomendadas en la etiqueta. No tiene acción corrosiva sobre los equipos de aplicación.

CATEGORIA TÓXICOLOGICA: **II - MODERADAMENTE PELIGROSO**

METODO DE EMPLEO

Realice la aspersion sobre la planta usando equipos de aplicación convencionales. Para la preparación disuelva completamente la cantidad de GATILLO 350 SC a usar en el tanque de mezcla, que contenga agua hasta $\frac{3}{4}$ o la mitad; complete el volumen de agua y agite hasta que la mezcla sea homogénea. Agite la mezcla permanentemente. Recuerde calibrar el equipo de aspersion y verificar el estado de las boquillas.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

El número de aplicaciones y momentos de aplicación estará en función a las condiciones climáticas y características de manejo del cultivo. En Pompón, llevar acabo monitoreo para establecer presencia de la plaga. En Papa, iniciar aplicaciones cuando se observe presencia de adultos.

Fecha de actualización: Agosto de 2023



RECOMENDACIONES BÁSICAS

Lea la etiqueta y siga las instrucciones y recomendaciones del producto. Utilice ropa adecuada: pantalón largo, camisa manga larga, botas, guantes, máscara con filtros y protector de ojos. No aplique el producto en dirección contraria al viento. No utilice la boca para destapar boquillas. No lave equipos en fuentes de agua. No utilice envases de agroquímicos para uso doméstico. Realice triple lavado al envase, inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para su gestión.

PRESENTACIONES

250 cc, 1 L y 20 L

RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO					
CULTIVO	PLAGA		Dosis	PC (días)	PR (horas)
	Nombre común	Nombre técnico			
PAPA	Mosca Blanca	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	0,25 - 0,50 cc/L	3	4
POMPON			a 150 -300 cc /ha	NA	

P.C: Período de carencia. Días transcurridos entre la última aplicación y la Cosecha.

P.R: Período de reentrada. Periodo de tiempo para el reingreso del personal al área tratada.

N.A.: No aplica.

Fecha de actualización: Agosto de 2023