



OFICIAL® 250 EW

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Ingrediente activo: Tebuconazole 250 g/L

Registro Nacional ICA: 796

Formulación: Emulsión Aceite en Agua (EW)

Uso: Fungicida de uso agrícola

FRAC: 3

MODO DE ACCIÓN

Es un fungicida sistémico perteneciente al grupo de los Triazoles con acción preventiva, curativa y erradicante. Por su actividad sistémica, se transloca dentro de la planta previniendo y controlando el ataque de hongos. Actúa inhibiendo la biosíntesis del ergosterol, el cual es importante para el funcionamiento de la membrana celular, influyendo en los procesos de división celular, estimulación del crecimiento y reproducción de los hongos, alterando su desarrollo y facilitando el control de la enfermedad.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los insecticidas y fungicidas de uso común. No es compatible con productos de reacción alcalina. Se recomienda realizar previamente a la mezcla de tanque una prueba de compatibilidad física con otros productos usando las dosis recomendadas en la etiqueta.

CATEGORIA TÓXICOLOGICA: **III - LIGERAMENTE PELIGROSO**

METODO DE EMPLEO

Realice la aplicación usando equipos de aspersión convencionales. Para la preparación de la mezcla, llene el tanque hasta la mitad, agregue la cantidad requerida de OFICIAL 250 EW, mezclando muy bien, y complete el resto del volumen con agua.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

De acuerdo con la susceptibilidad de las variedades y de las condiciones ambientales predominantes, en Arroz las aplicaciones se deben hacer en la época de floración y es recomendable de acuerdo con el nivel de infección presente, realizar una segunda aplicación rotando con otros ingredientes activos de otros grupos químicos. Para el caso de papa se deben realizar aplicaciones sistemáticas en intervalos 14 días, iniciando en la época de floración del cultivo.

Fecha de actualización: Agosto de 2023



RECOMENDACIONES BÁSICAS

Leer la etiqueta antes de usar el producto, siga las instrucciones y recomendaciones. Utilice ropa adecuada: Pantalón largo, camisa manga larga, botas, guantes, mascarilla y protector de ojos. No aplique el producto en dirección contraria al viento. No utilice la boca para destapar boquillas. No lave equipos en fuentes de agua. No utilice envases de agroquímicos para uso doméstico. Realice triple lavado al envase, inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para su gestión.

PRESENTACIONES

250 cc , 1 L

RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

CULTIVO	PLAGA		Dosis	PC (días)	PR (horas)
	Nombre común	Nombre técnico			
Arroz	Manchado de Grano	<i>Helminthosporium oryzae</i> , <i>Cercospora oryzae</i> , <i>Sarocladium oryzae</i> y <i>Rhynchosporium oryzae</i>	0.5 – 0.6 L/ha	35	4
Papa	Alternaria	<i>Alternaria solani</i>	0.45 – 0.90 L/ha	7	

P.C: Período de carencia. Días transcurridos entre la última aplicación y la cosecha.

P.R: Período de reentrada. Periodo de tiempo para el reingreso del personal al área tratada.

Fecha de actualización: Agosto de 2023