



Invicto®

20% SC

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Ingrediente activo: Zinc Thiazole (200 g/L)

Registro Nacional ICA: PL0007252023

Formulación: Suspensión Concentrada (SC)

Uso: Bactericida de uso agrícola

FRAC: M03 – Ditiocarbamatos y similares con acción multisitio

MODO DE ACCIÓN

Bactericida con acción protectora, curativa y sistémica. El producto es rápidamente absorbido y translocado por toda la planta a través del sistema vascular. Capaz de eliminar infecciones ya establecidas.

COMPATIBILIDAD

Puede ser mezclado con la mayoría de plaguicidas. No tiene acción corrosiva sobre los equipos de aplicación. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

CATEGORIA TÓXICOLOGICA: 4 - LIGERAMENTE PELIGROSO

METODO DE EMPLEO

Realizar la aplicación de INVICTO 20% SC acorde con el cuadro de dosis de manera preventiva, cuando las condiciones climáticas sean favorables para la presencia del patógeno.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Realizar la aplicación de INVICTO 20% SC en forma preventiva, cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad, o cuando las condiciones climáticas sean favorables para la presencia del patógeno, al momento de la siembra, haciendo una buena cobertura de la semilla antes de tapar o a la emergencia del cultivo.

Fecha de actualización: Febrero de 2024

RECOMENDACIONES BÁSICAS

Leer la etiqueta antes de usar el producto, siga las instrucciones y recomendaciones. Utilice ropa adecuada: Pantalón largo, camisa manga larga, botas, guantes, mascarilla y protector de ojos. No aplique el producto en dirección contraria al viento. No utilice la boca para destapar boquillas. No lave equipos en fuentes de agua. No utilice envases de agroquímicos para uso doméstico. Realice el triplelavado en envases para líquidos.

PRESENTACIONES

250 ml, 500 ml, 1 L, 4 L, 20 L, 200 L

RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

CULTIVO	OBJETIVO BIOLÓGICO	Dosis	PC (días)	PR (horas)
Papa (<i>Solanum tuberosum L</i>)	Marchitez bacteriana (<i>Ralstonia solanacearum</i>)	2.5 L/ha	N.A.	4

P.C: Período de carencia. Días transcurridos entre la última aplicación y la cosecha.

P.R: Período de reentrada. Periodo de tiempo para el reingreso del personal al área tratada.

N.A.: No aplica

Fecha de actualización: Febrero de 2024