

COHETE®

75 WP

1. Información general del producto

Ingrediente activo: Cyromazina 750 g/Kg

N° de Registro: PL0020582023

Formulación: Polvo Mojable (WP)

Uso: Insecticida de Uso Agrícola

Fórmula química: C₆H₁₀N₆

Familia química: Triazinas

Clasificación: IRAC 17

Propiedades fisicoquímicas:

- **Apariencia:** Sólido blanco a ligeramente gris
- **Densidad:** 0.32 g/ml
- **pH:** 8-10
- **Inflamabilidad:** No inflamable
- **Explosividad:** No explosivo

2. Modo de acción

COHETE® 75 WP es un insecticida de triazina con acción por contacto que opera como regulador de crecimiento de los individuos e interfiere en el ciclo de desarrollo de las larvas, afectando su proceso de muda y ocasionando su muerte.

3. Compatibilidad

Evite la mezcla de COHETE® 75 WP con productos de reacción alcalina. Cuando se requiera hacer mezclas de COHETE® 75 WP con otros agroquímicos, se recomienda hacer una prueba de compatibilidad a pequeña escala, previa a la mezcla final de los productos, con el fin de determinar la compatibilidad física.

4. Categoría toxicológica:

Categoría toxicológica: 4 – Ligeramente Peligroso

DL₅₀ oral aguda: >500 mg/kg

DL₅₀ dermal aguda: >2000 mg/kg

DL₅₀ inhalatoria aguda: >5 mg/L/4 h

Irritación ocular: Causa irritación moderada a los ojos

Irritación dermal: Irritación leve o ligera

Sensibilización: No sensibilizante

Fecha de actualización: 10-Sep-2025

Elaborado por: Asuntos Regulatorios

5. Método de empleo

Aplique COHETE® 75 WP de forma terrestre garantizando una cobertura apropiada del cultivo. Evite aplicar en época de sequía o ante eventos de lluvia inminente.

6. Frecuencia y momento de aplicación

Aplique COHETE® 75 WP cuando se presenten los primeros signos de la plaga (galerías) en el cultivo.

Para favorecer un óptimo desarrollo del cultivo, se sugiere que COHETE® 75 WP esté enmarcado en un Plan de Manejo Integrado de Plagas con rotación de productos de diferente grupo químico.

7. Recomendaciones básicas

COHETE® 75 WP se puede aplicar con equipos de fumigación convencionales. Utilice siempre equipos limpios y debidamente calibrados, asegurando una aplicación uniforme y una cobertura apropiada. Para preparar la mezcla llene el tanque hasta la mitad con agua, luego agregue la cantidad de COHETE® 75 WP recomendada y agite vigorosamente, luego termine de llenar el tanque con agua agitando continuamente con el fin de obtener una mezcla homogénea. Las mezclas de COHETE® 75 WP se deben aplicar inmediatamente después de preparadas.

El volumen de agua recomendado para la mezcla en el cultivo de cebolla y tomate es de 600 L/ha, y para pompón de 1000-2000 L/ha dependiendo de la densidad de siembra y/o etapa fenológica del cultivo. Sin embargo, se recomienda realizar una calibración previa para determinar el volumen de agua óptimo.

8. Presentaciones

60, 70, 75, 250 y 500 gramos

9. Recomendaciones de uso y dosis

Cultivo	Plaga		Dosis		PC (días)	PR (horas)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	g/L	Kg/Ha			
Pompón	Minador	<i>Liriomyza</i> sp	-	0.120 - 0.180	N.A	4	N.A
Cebolla	Minador	<i>Liriomyza</i> sp	-	0.120 - 0.180	21	4	0.1
Tomate	Mosca blanca	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	-	0.180 - 0.240	1	4	1.0

PC: Periodo de carencia | PR: Periodo de reentrada | LMR: Límite máximo de residuos