

Ferrari

750 WG

1. Información general del producto

Ingrediente activo: Halosulfuron-Methyl 750 g/Kg

N° de Registro: PL0005892024

Formulación: Granulos dispersables (WG)

Uso: Herbicida de Uso Agrícola

Fórmula química: $C_{13}H_{15}ClN_6O_7S$

Familia química: Pirazol

Clasificación: HRAC B – WSSA 2

Propiedades fisicoquímicas:

- **Apariencia:** Sólido granulado color blanco, sin olor
- **Densidad relativa:** 0.66 g/cm³
- **pH:** 6.1
- **Inflamabilidad:** No inflamable
- **Explosividad:** No explosivo

2. Modo de acción

FERRARI 750 WG es un herbicida sistémico y selectivo que se absorbe principalmente por las hojas, los tallos verdes y el sistema radicular; es utilizado para el control selectivo de malezas de hoja ancha y ciperáceas en cultivos de arroz. Es un producto de aplicación foliar y edáfica que actúa en pre y pos emergencia. Actúa inhibiendo la enzima acetolactato sintetasa (ALS) encargada de participar en la síntesis de aminoácidos (Valina, Leucina, Isoleucina).

3. Compatibilidad

No se recomienda mezclar FERRARI 750 WG con otros productos sin antes realizar pruebas de compatibilidad a pequeña escala.

4. Categoría toxicológica:

4 – Ligeramente Peligroso

5. Método de empleo

Agregue agua en el tanque de preparación hasta la mitad de su capacidad, vacíe el producto directamente al recipiente y mezcle bien mediante agitación mecánica. Puede ser aplicado con bombas de espalda y con equipos terrestres con un volumen de agua suficiente que cubra de forma uniforme el área a tratar (volumen de descarga

de 150 L/Ha). Se recomienda utilizar equipos con boquillas de pulverización de cono hueco, boquillas de chorro plano uniforme por aire inducido, boquillas de chorro plano uniforme anti-deriva, boquillas de chorro plano uniforme, boquillas de chorro plano uniforme, boquillas de pulverización en bandas y dirigida, boquillas de pulverización de cono lleno y/o boquillas de pulverización de cerámica.

6. Frecuencia y momento de aplicación

Se recomienda realizar una aplicación de FERRARI 750 WG en pre-emergencia de las malezas y post-emergencia temprana al cultivo y a las malezas, cuando estas se encuentren en los primeros estados (entre 3 a 4 hojas verdaderas). Aplicar de manera homogénea en toda el área de acuerdo con la dosis especificada con buenas condiciones de humedad, con el objetivo de tener una mejor penetración y movimiento del producto sobre las malezas susceptibles.

7. Recomendaciones básicas

FERRARI 750 WG se puede aplicar con equipos de fumigación convencionales. Utilice siempre equipos limpios y debidamente calibrados, asegurando una aplicación uniforme y una cobertura apropiada. Para preparar la mezcla llene el tanque hasta la mitad con agua, luego agregue la cantidad de FERRARI 750 WG recomendada y agite vigorosamente, luego termine de llenar el tanque con agua agitando continuamente con el fin de obtener una mezcla homogénea. Las mezclas de FERRARI 750 WG se deben aplicar inmediatamente después de preparadas.

8. Presentaciones

10 g y 150 g

9. Recomendaciones de uso y dosis

Cultivo	Plaga	Dosis	PC (días)	PR (horas)	LMR (mg/kg)
		Kg/Ha			
Arroz	Junquillo (<i>Cyperus rotundus</i>)	0.150	N.A	0	0.01*
	Barba de Indio (<i>Fimbristylis miliacea</i>)				
	Coquito (<i>Cyperus rotundus</i>)				
	Estrella Blanca (<i>Dichromena ciliata</i>)				

PC: Periodo de carencia | PR: Periodo de reentrada | N.A: No aplica | LMR: Límite máximo de residuos. *Fuente: Unión europea